

(3.)
DE

PROCIDENTIA UTERI

SPECIMEN INAUGURALE CHIRURGICO-
MEDICVM

QVOD

CONSENSV ILL. FACVLTATIS
MEDICAE

IN

ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA

PRO

GRADV DOCTORIS
MEDICINAE ET CHIRVURGIAE

DIE XXXI. DECEMBRIS A. MDCCLXXXVII.

PVBlice DEFENDET

AVCTOR

IOAN. HENRICVS WILHELMVS
KLINGE

GOETTINGENSIS.

Annexae sunt II. Tabulae.

GOETTINGAE,

TYPIS H. M. GRAPE, ACAD. TYPOGR.

1874

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

Acquired from the

Library of the

City of New York

1874

1874

1874

1874



Prolegomena.

Finito studio academico primum id meditabar, ad quam artis salutaris partem animum adverterem, ut specimen exhiberem elaboratum. Tandem placuit notatu dignam materiam de procidentia uteri connexa cum pessariorum descriptione & applicatione eligere. Animus quidem non est, aliquid novi excogitare, atque in medium protrudere, id quod nimium esset ei, qui non, plane omnia artis salutaris adyta penetravit. Quantum vero fieri potuit, id modo cogitavi, ut senten-

tias diversorum clarorum in hac arte virorum colligerem, atque quaedam pessaria forma exprimerem, quasdam una recensiones ex nostro utilissimo Instituto Regio Clinico adjungerem, quod jamjam sub auspiciis atque directione Ill. FISCHERI praeceptoris colendi floret. — Quomodo rem tetigerim atque ad finem quaesitum tetenderim: id judicio lectorum probae fidei cum verecundia permitto.

§. I.

Definitio & Descriptio morbi.

Sub nomine procidentiae uteri intelligitur descensus ejus e loco pristino forma non mutata, & quidem orificio ejus praevio, per vaginam extra partes genitales. —

Ea

Ea est definitio morbi, qui adpellatur *proci-*
dentia seu *prolapsus uteri*, gallice *Déscente*,
Chûte, ou *précipitation de la matrice*, graeco
 idiomate, *προπτωσης της μήτρας*, anglice
Downfalling of uterus, belgarum lingua *Uyt-*
synkingh der Lyf-Moeder & germanice *Mut-*
tervorfall, *Mutterausfall*, tam apud veteres,
 quam apud recentiores auctores, de quo
 hic proprie agitur. Huc ergo haud perti-
 net depressio, nec inversio, nec retroversio
 uteri, nec prolapsus vaginae, quatenus hic
 posterior non est sequela prolapsus uteri. —
 Prisci Medici jam probe callebant hoc discrimen,
 quod clarissime patet ex scriptis HIP-
 POCRATIS a), BALLONII b), AETII c), PA-
 RAEI d), ROUSSETI e), PRIMEROSII f),

A 2

RUY-

a) De morbis mul. L. II. aliisque locis.

b) Opera omnia medica T. IV. Cap. IX.

c) In opp. Spachii.

d) De generat. hom. in opp. Gasp. Wolf.
 T. II. Cap. 61.

e) De partu caesar. in opp. G. W. eod. T.

f) De morbis mulierum L. II. C. XV.

RUYSCHII g), aliorumque rei medicae peritorum. — Quod mirum est, hoc malum, de quo hic sermo est, observatum fuit non solum apud mulieres quae jam partus edidere, sed etiam apud virgines h), imo adeo apud infantes i) & moniales k).

§. 2.

Et si nemo hodie, postquam clarior lux adfusa est, inficias ibit, esse prolapsum uteri: non defuerunt tamen olim viri, inter quos KERKRINGIUM l), ROONHUYSIUM m) nomino, qui de eo dubitarunt, asserentes:

Uterum

g) Opera anat. chirurg. T. I. Obs. 7. p. 10.

h) MAURICEAU Observations sur la grossefle.
T. II. Obs. 96. p. 80.

i) MONRO Sämtliche Werke p. 225.

k) SAVIARD Recueil d'observations chirurg.
p. 50.

l) Observationes anatomicae p. 49. & 113.

m) Heel-konstige Aenmerkingen p. 73.

Uterum esse nimis arcte annexum per ligamenta sic dicta lata & rotunda, osse pubis, sacro, aliisque proxime existentibus partibus, quam ut demitti posset. Concedunt quidem, casum accidere posse, ubi videlicet, per violentam extractionem secundinarum, vel per alias causas violentas, uterus per disruptionem ligamentorum protrahi possit: tum vero nullam sanationem esse posse, & afflictas certissima fata obituras esse. Quod alii tamquam uteri prolapsum venditarent, id illi tantummodo pro relaxatione tunicae internae vaginae habebant. — Hanc opinionem minus esse fundatam, id sane probant observationes & sectiones cadaverum RUXSCHII n), LE-

VRETI

n) l. c. ait: in pelvi cadaveris feminae qui locus est uteri nil vidimus, praeter unum ex ovariis cum annexa tuba & ligamento lato cet.

VRETI o), MAURICEAU p), SAVIARDII q)
 aliorumque, qui his doctrinis miram illu-
 strationem adtulerunt,

§. 3.

Inde ab antiquissimis seculis prolapsus
 uteri discernebatur in descensum ejus & in
 procidentiam ipsam. Haec divisio etiam rei
 naturae est adcommodata. Vocabo igitur
 primum gradum, procidentiam incomple-
 tam, alterum vero, completam. — Intel-
 ligitur nempe sub *prolapsu incompleto uteri*
 ejus descensus ex suo pristino fixo loco ci-
 terius & inferius in vaginam, adeo inter la-
 bia magna, ubi attentio excitatur, vel per
 symptomata, de quibus mulier queritur, vel
 per

o) Journal de medecine par M. Roux T. XL.
 p. 170. seq.

p) l. c. T. I. p. 398.

q) l. c. Obs. II. p. 42.

per internam explorationem r). Si vero uterus offenditur extra magna labia, postquam vagina inversa & segmentum inferius sequuta est, tum *hic gradus procidentiae uteri vocatur completus*,

§. 4.

Disceptatur vero, utrum prolapsus vaginae semper antecedit procidentiam uteri, ac postea uterum protrahat? an uterus vaginam cogeret, ut sese verteret ac sequeretur? — potest equidem prolapsus vaginae praecedere uteri prolapsum, rarissime vero sequitur

A 4 postea;

r) Quidam eum primum gradum prolapsus vocare volunt, si uterus absque symptomatibus excitatis se paulisper in vaginam confert. Quum vero id accidere consueverit mulieribus, quae pluribus vicibus parturiunt, nec alia signa proferri possint, praeter internam explorationem: haec attingere nolo, nec ulterius rimari.

postea; ac si insequitur, tunc est ratio continuantis relaxationis, non vero prolapsus tunicae internae vaginae. At vero si prolapsus uteri transit ad gradum secundum: tum necesse est, ut vagina uterum sequatur, atque prolapsum vaginae excitet s).

§. 5.

Symptomatologia.

Quod attinet ad signa, quibus hic morbus dignoscitur: facile ea ex uteri descensu e sede pristina possunt derivari; dum ea re dolores non modo in partibus proximis, sed etiam in remotioribus excitantur. Si descensus uteri subito accidit per causam violentam: tum quoque symptomata sunt vehementiora: at vero tolerabiliora sunt, si uterus magis tardo motu, vel minus vehementiori causa delabatur. Utique non semper, ex his judiciis symptomatum, certo pro-

prolapsus uteri concludi potest, nisi conjungatur exploratio interna. Id vero pro certo constat, nos per ejusmodi signa ad curiosiorem inquisitionem partium genitalium excitari, ac si accidere vult id malum, per remedia debita posse amoveri.

§. 6.

Situs uterus est, ut anatomiae peritissimus quisque novit, in cavitate pelvis, fere ab ossibus ilei circumdatur, cervix vero cum crista ossium pubis in aequali est altitudine. Partes vicinae anteriores sunt vesica urinaria, & posteriores intestinum rectum, cum quibus ambobus conjunctus est uterus per continuationem peritoneaei retrogradientis ab ossibus pubis, quorum duplicitatibus deinde sic dicta ligamenta lata & rotunda uteri formantur. Per has vias non modo sanguinem recipit, sed nervi ei quoque adducuntur, quibus subtilissimus consensus uteri cum ce-

teris visceribus per totum corpus oritur. Et ea ratione quoque symptomata sunt explicanda, quae ex dislocatione uteri ex suo situ oriuntur.

§. 7.

In primo gradu prolapsus uteri, quem secundum Ill. LEVRET t) *semiprolapsum* nominare solemus, uterus ex cavitate pelvis majoris, in minorem cavitatem se demisit, atque reperitur in vagina, ubi premendo vicinas partes, symptomata ea quae sequuntur efficit, quae vel eo majores dolores cient, quo magis uterus delabitur.

- 1) Mulieres conqueruntur de doloribus in regione lumbari, & ossis sacri, circa inguina, in cavitate pelvis ipsa, & in tota regione vaginae, quae symptomata ab tensione ligamentorum & partium cum iis conjunctarum, sunt orta, atque concludenda.

2) Sen-

t) l. c. p. 180.

2) Sentiunt gravitatem quandam in superiori vaginae parte, quae efficitur partim per pondus uteri, partim per intestina in eum prementia u), quae gravitas recta corporis statione, accumulatione fecum, & appropinquatione fluxus menstrui augetur,

3) Proveniunt varia vitia circa mictum, quia per citiorem descensum uteri, vesica urinaria in ejus locum succedit, unde collum vesicae plicam accipit, effluxum urinae impedit, imo, vel adeo excretio urinae impedita accidere potest v). Haec impedita urinae excretio,

u) CAMPERS Betrachtung über einige Gegenstände in der Geburtshülfe I Th. p. 107.

v) Conf. FABRE traité des observations de chirurg. p. 172. ASTRUC traité des maladies des femmes T. III. p. 403. ait : Lorsque la descente est incomplète, c'est-à-dire, lorsque la matrice tombe jusqu'à l'orifice

cretio, a multis mulieribus levamentum accipit, si se in genua demittunt, atque in cubitis nituntur, ubi eodem modo non solum uterus recedit, sed etiam vesica ad suam sedem regreditur, ita ut urina, pro eo ac debet, effluere queat.

- 4) Exoneratio alvi magna fit cum difficultate, nam demissus uterus comprimit intestinum rectum, feces retinentur, indurantur, ac levamentum alvi eo magis difficile reddunt.
- 5) Plerumque fluor albus hujus mali est comes, qui vel prolapsus antecessit, vel ut consequentia est considerata.

Haec

l'orifice du vagin, la vessie se trouve comprimée, si le col de la matrice tourne de son côté; & alors sa cavité étant diminuée, les malades sont obligées de pisser souvent, & quelque fois même elles ont peine à pisser, lorsque l'urethre est fortement comprimée.

Haec sunt fere praecipua symptomata externa, quae indicant prolapsum uteri primo gradu. Ea sunt tolerabiliora, si mulier se tenet in situ horizontali, augentur vero si diu in perpendiculari situ se movet. Quo certius evinci possit, an sit id malum, quod symptomata indicant, eo curatius exploratio interna est instituenda: ubi segmentum inferius uteri, ope digitorum proximum ac tumidum sentietur w).

§. 8.

In *secundo gradu prolapsus*, uterum conspiciamus extra partes genitales, sequenti modo

w) Ill. LEVRET l. c. p. 184. consilium dedit, hanc explorationem esse instituendam potius vespere quam mane, mulierique esse antea clysterem adplicandum, ad evacuandas feces, quae ut pessarium possunt retinere uterum. quia hic cardo rei versatur in eo, ut semiprolapsus a prolapsu completo distinguatur.

modo jacentem : ita ut orificium uteri clare conspiciatur, corpus autem ac fundus uteri, cujus extremitas sub ossibus pubis pendet, circumcluditur ab inversa & segmentum inferius secuta vagina. Hae procidentes partes se offerunt visui nostro ut massam carnis oblongam, &, uti majores ajunt, ut glandem virilem. In pelvi nil amplius videre licet de utero, sed locum ejus occuparunt vel vesica urinaria, vel proxime adjacentia viscera, quibus ad introitum jam novum cavum est apertum. Hinc Ill. CAMPER x) prolapsum uteri contemplatur tamquam veram herniam intestinorum.

§. 9.

Quod omnia symptomata, quae in descriptione primi gradus indicabantur, jam secundo gradu non parum augeantur: id certe quisque haud difficulter judicabit, si uteri
situm

x) l. c. p. 108.

fitum extra labia magna perpendit, atque considerat, quantopere tensio ligamentorum uteri, cunctarumque conjunctarum partium, ut vesicae, intestini recti, immo adeo omnium viscerum abdominalium increascit. Unde non raro, si prolapsus fit subitaneus, animi deliquia, motus febriles, haemorrhagiae ac plura alia contingere videmus y). — Mictus est eo difficilior, quia jam fundus vesicae propius in cavitationem pelvis introiit, eoque plica in collo orta fortior est facta. — Per frictionem ergo, quam sensibilibior vagina, atque segmentum inferius uteri, ab cruribus & vestitu patitur, ut & per situm extra sedem procidentium partium, non solum affluxus sanguinis augetur, ac destillatione urinae partes inflammantur, eumque in modum intumescere possunt, ut usque ad dimidiam crurum regionem interdum dependere videantur.

y) PRIMEROSIUS l. c. DE HEER observ. medicar. Obs. XXII.

videantur z). Oriuntur in fine excoriatio-
nes, exulcerationes, indurationes scirrhusae,
unde carcinomata, ulcera fistulosa, quae fi-
unt gangraenosa & mortifera a). — Insu-
per hoc accidit, si aegrotantes mulierculae ex
intempestiva maleque adhibita celatione in-
causa esse solent, quo minus tempestive cu-
rentur. Immo adeo adsuescunt huic malo,
plicae & rugae vaginae abeunt, & super
iis inducitur epidermis b), ut hac conditione
multos per annos, quid? quod per totam
vitam in eo statu permaneant.

§. 10.

Nihil vero medico practico ac patho-
logo, in prolapsu uteri attentione dignius
esse

z) MAURICEAU l. c. p. 79. Obs. 96. multis-
que aliis locis.

a) Iconismi de prolapsu uteri incompleto &
completo inveniuntur in RUYSCHE operib.
anat. chirurg. T. I. p. 11. fig 8 & 11.

b) HILL medical and philosophical commen-
taries of Edinburgh p. 88.

esse potest, quam adhibere eam tum, cum fluxus menstruus orificio uteri procedit, ad quam prisca medici attentionem nos evocarunt. c) d)

Diagnos.

§. II.

Nullis sane morbus H. C. apud majores antiquissimo que scriptores tam confusus fuit, quam hic prolapsus. Id vero inde contigit, quia sexus sequior tunc temporis justo vercundior erat, qua pudicitia impediatur, quo minus medico malum hoc detegeret. Non nisi obstetrices in his malis in consilium

c) HIPPOCRATES de morbis mul. L. II. C. 39. II.

d) Ob compressionem, quam uterus in vagina patitur, sanguis viam facilem retro non potest capere, ac menses non raro degenerant in haemorrhagiam habitualement,

lium sunt adhibitae, quae huic morbo modo hoc modo aliud imponebant nomen. Inde fabulae originem traxerunt de hermaproditis, quae denominatio olim non paucis feminis Romanorum tempestate vitam rapuisse videtur. — Mei officii ergo hic esse puto, lectoribus meis eos indicare morbos, quibuscum prolapsus facile confundi potest.

§. 12.

Cum prolapsu in primo gradu haud raro *fluor albus* est conjunctus, qui ab imprudentibus chirurgis & obstetricibus facile existimari potest pro pure, sanie, i hore, & ab illis pro effectu & consequentia scirrhi segmenti inferioris uteri transeuntis in carcinoma haberi potest; praesertim ubi symptomata defensus uteri eos magis deducunt ad ideas, quas male de carcinomate sibi conceperunt, confirmandas. Exempla in promptu

promptu sunt feminas a pseudomedicis ita esse tractatas, cum tamen morbus non nisi prolapsus uteri esset, qua sinistra cura vero non modo corpus miserarum femellarum infirmatum, ac debilitatum, sed malum quoque ita exacerbatum fuit, ut nulla restitutio per medicamina esset speranda e). — Negari haud potest, varias molestias congruere cum iis, quas carcinoma uteri secum ferre solet, e. g. dolores intra pelvim, in ligamentis uteri, in cruribus, difficilis mictus, immo adeo ischuria, tenesmus, & jam dictus fluor albus, qui succedente longo temporis commate, adeo etiam acris fieri consuevit, quae circumstantiae omnes suspicionem eo magis augent. Verum enim vero, exploratio cautior atque cum saniori iudicio instituta, symptomata, quae in statu

B 2

car.

e) Puzos traité des accouchemens p. 244. sq.

LEVRET Journal de médecine T. XXXIV.

p. 454.

carcinomatis magis spastici ac inflammatorii generis sunt, quoque per usum antispasmodicorum cessant, causae antecedentes, effluxus ipse, qui ut plerumque cum foetore conjunctus, ichorosus & tenuior sicuti in fluore albo observatur, ac tandem ipsa exploratio interna segmenti inferioris & colli uteri, quod in carcinomate, quam maxime dolorificum, durum atque inaequale hiulcum est; in casu procidentiae vero, molle elasticum, absque sensu doloris tactu facile, aliaque ejus generis signa, nos confestim de rei veritate convincere possunt; praesertim si excrementariae fungosae pullulantes comparent, quae in vagina procedunt. f)

§. 13.

Longe alius morbus est *polypus uteri*, facile cum prolapsu confundendus. In ortu
&

f) Miscellan. N. C. Dec, I, Ann. II. Obs. 121.

& praesentia hujus alieni corporis deprehendimus fere eadem symptomata, uti in prolapsu uteri, praesertim si magnitudine accrescit, & vaginam implet. Ad eum distinguendum de prolapsu, sequentia sunt animadvertenda: interna exploratio est singulare, atque praecipuum medium distinguendi. Polypus enim in tactu ejus offenditur longe mollior, ac minus sensibilis quam collum uteri; si tentamus eum reponere, tum resistibilis est, atque mulieri adfert varias molestias, quae locum non habent, si prolapsus retro inferatur, sed potius minuuntur. Stylus exploratorius juxta eum in os uteri, adeo etiam usque ad fundum detrudi potest. In prolapsu vero statim fertur in vaginam cum utero delapsam. Non reperitur in medio tumoris apertura, & si qua est, eam stylo prosequi non possumus. Figura polypi refert formam piri, ab inferiori parte rotunda, lata, in superiori vero figuram habet

arctioem, id quod in prolapsu eo modo non sic se habet. Si polypus prominet ex genitalibus : tum inversioni uteri quidem non absimilis apparet, sed de quo hic loquor prolapsu uteri, per defectum in oris uteri, per majorem gradum duritiei, ac per vasa varicosa sanguifera, quae apparent, quam maxime est distinguendus. Ortus polypi & incrementum ejus tardius factum, tamquam ultimum requisitum polypi adferri potest, quoniam successive absque caulis fonticis praecedentibus surgere solet: quum e contrario in prolapsu uteri aliqua saltem praecedens causa sit vel levissima, in memoriam revocari solet. g)

§. 14.

g) Conf. Ill. VAN SWIETEN Comment. in H. BOERHAAVE Aphorismos T. IV. p. 530. SAVIARD l. c. p. 57. RUYSCH l. c. T. I. Obs. LVIII. p. 54. seq.

§. 14.

Ill. SAVIARD h) multique alii adferunt exempla in suis scriptis, feminas prolapsu completo laborantes, pro *Hermaphroditis* esse habitas, & quidem a medicis alias non minoris famae. Etsi vero hic error exper-torum medicorum non excusari potest; cum, ex rationibus praegnantibus, ejusmodi genus hominum non existat: sunt tamen casus, quorum occurſu, feminae ab ignariſ chirurgi & obſtetricibus tales fuerunt declamatae. Sic accidit virgini Tolofanae, quam vir ſupra dictus memorat. Juſſa enim eſt a ma-giſtratu loci, ubi verſabatur, virili habitu ſe induere. Miſera femina ergo coacta erat, per varias provincias vagari, ſeſeque pro ſo-luto pretio conſpiciendam offerre; multique erant ſatis ſuperſtitioſi atque creduli, hanc feminam habere pro eo, quod non eſſet

B 4

atque

h) l. c. Obſ. XV, pag. cit.

atque inde rumor de Hermaphrodita pervagabatur orbem. Supra indicatus chirurgus Parisiensis eam explorabat curatius, inspectoque errore confratrum, eam in feminarum ordinem restituebat. Si observamus etiam orificium in extremitate tumoris, ex quo tempore consueto menses fluunt: si clitoris imperforata, attentione quadam conspicitur, nec minus praesentia labiorum magnorum nympharumque, porro, si effluxus urinae observatur, praesentia mammarum, & quod certum argumentum est, facillima reductio hujus prolapsae partis: nullum restat dubium, quo minus credamus, adesse verum prolapsum, non autem scrotum.

§. 15. 1

Quartum morbi genus bene est distinguendum nempe *prolongatio colli uteri* leu portionis vaginalis, de qua re Ill. HOIN i) adfert

i) Journal de medicine T. XL, p. 352.

adfert observationes. Adferit enim, quod collum uteri in naturali statu, vix pollicis lati longitudinem habens, per varias causas possit prolongari, usque ad sex, octo, & plures pollices latos, ac una, ratione voluminis, ad sex vel septem pollicum latitudinem extendi queat; quod de cetero corpus uteri ob eam rem non patiatur, sed maneat in positione naturali. Discrimen huius casus a prolapsu non adeo facile esse, unusquisque perspiciet, si ponderat magnam similitudinem, quam uterque casus habet. De existentia ejusmodi prolongationis colli uteri, si quis dubitare velit, nimium audax in asserendo foret, cum plures Viri experti & prae aliis Ill. LEVRET k) id testentur. Forma cylindri instar in parte prominente, modus existendi parum cum dolore conjunctus, ac successivus, & impedita restitutio ac reductio ad locum interior-

rem,

k) l. c. p. 360. seq.

rem, quam observatores queruntur, charitatem aliquam adferre potest ad diagnofin.

§. 16.

Cum *prolapsu vaginae partiali seu uni-*
versali, potest etiam procidentia uteri haud
difficulter commutari. Signa ergo sunt in-
dicanda, quibus distingui potest. Vagina
habet pro interno vestitu membranam la-
xam, mollem, rugosam atque facile ceden-
tem. Haec tantum per varias causas adeo
relaxari, atque expandi potest, ut se solvat
ab subjacente tela cellulosa, atque vel to-
ta procidit, vel modo unum latus ejus se-
se extra vaginam ostendit. — Si vagina
plane prolapsa est: tum conspicitur in me-
dio tumoris insurgentis apertura quaedam,
ex qua tempore statuto menses profluunt.
Hoc orificium sine opere discernitur per oras
complicatis, rugosas, & quasi intro verfas,
perque multo majores hiatus, ab illo vero
orificio,

orificio, quod discernitur per oras laeves prominentes. Nec quisquam valet cum stylo inter tumorem & labia magna penetrare. — Si unicum latus tunicae internae vaginae modo affectum est, tum conspicitur apertura in ora tumoris, non vero in medio. — In utroque casu vero error non habet locum: si una consideratur modus existendi: numquam enim se exferit signum dolorificum vel aliud symptoma. l)

§. 17.

Unus adhuc casus suspicionem prolapsus uteri in primo gradu movere potest, nempe *dislocatio matricis*, quam Ill. LEVRET quoque sub titulo *déplacement de la matrice* descripsit m).

Feminae

- l) LEVRET l. c. p. 178. BARBETTE Chirurg. P. I. C. 8. p. 36. DAV. VAN DER BEEK de uteri procidentia.
- m) l. c. p. 269. Ill. STEIDELE Sammlung chirurgischer Beobachtungen 3ter Band, p. 188.

Feminae sentiunt varias molestias in pelvi, similes iis, cum ex prolapsu uteri connexae sunt. Praecipue premuntur urinatione difficili, abdomen plerumque est inflatum, & si tangitur, dolorem excitat. Menfes sunt inordinati, fluor quoque albus se exserit. In exploratione interna, orificium uteri non reperitur. Hanc dislocationem uteri esse possibilem, id probant sectiones cadaverum observatoris memorati. Offendebat enim uterum jacentem transversum in pelvi, orificium in media parte intestini recti, & fundum in fundo vesicae; anterior pars uteri erat tumefacta ac inflata.

§. 18.

Non raro etiam obveniunt casus, ubi *retroflexio seu retroversio uteri* cum prolapsu primi gradus, ob dolores & symptomata, potest confundi. Nempe fundus uteri sese demisit, in hoc morbo, inter intestinum rectum

ctum & vaginam, atque movet symptomata suppressionis urinae & alvi obstructionis. Id quidem eo, quod fundum uteri intestinum rectum vesicamque premit. Interna exploratio ac indagatio causarum, e. g. graviditatis, in tertio, quarto mense, ad diagnosis sufficiunt n).

§. 19.

Hernia vaginae sic dicta, facile potest distingui a procidentia uteri; quia partim tumor modo unum parietem vaginae adficit, partim quia os uteri in suo loco liberum ac plane tangitur.

§. 20.

n) Ill. WILLYCH Beobacht. von einer Umbeugung der Gebärmutter, & Ill. WAITZ Abhandl. sub eodem titulo. vid Ill. RICHTERI praeceptoris maxime colendi Chirurg. Biblioth. 5. B. 1. & 3. St. p. 132. & 548. Ill. HIRT Geschichte einer Zurückbeugung der Gebärmutter. vid. STARKE'S Archiv für die Geburtshülfe cet. 1. St. p. 48.

§. 20.

Hydrops perinaei quoque occasio esse potest ad confusionem. Nam paries posterior vaginae per instillatam aquam expanditur, tumque prominet vesicae instar. Facile autem convincimur, per fluctuationem aquae in tumore, de rei veritate.

§. 21.

Circumstantia quoque apud multiparas gravidas, contemplatione digna videtur; ubi videlicet in anteriori parte vaginae, sub arcu ossium pubis rotunda plica per internam scrutationem sentitur; quae vero nihil est aliud, quam membrana interna vaginae depressa per caput infantis.

§. 22.

Quod respicit discriminis judicia, inter *inversionem uteri* & prolapsum; non adeo magnis

magnis cum difficultatibus sunt conjuncta; si ex parte causas occasionales, e. g. violenta extractio secundinarum, partus acceleratus, & alia plura in censum veniunt, ex parte si attentionem dirigimus in externa signa manifestissima.

§. 23.

Id quod attinet ad *prolapsum uteri gravidi*, equidem videtur mirum quid esse: interim exstant Viri fide digni, e. g. FABRICIUS o) JALOUSSET p) GIRAUD q) SAVIARD (r) PORTAL s) & DUCREUX t), qui veritatem

o) Progr. de foetus vivi extractione utero prolapso. Helmst 1748. vid Ill. HALLERI disp. chirurg. Tom. III. p. 434.

p) Journal de medicine, T. XLIII. p. 366.

q) l. c. T. XLV. p. 232.

r) l. c. Obf. XV. p. 66.

s) Memoires de l'acad. royal. T. III. p. 360.

t) in eodem libro ac pagina,

tem ejus per observationes asseruerunt u). Praesupponi autem oportet, quod apud feminas quibus prolapsus uteri gravidi accidere debet, jam dudum procidentia uteri antecesserit: tum quidem tempore partus, aut quoque brevi ante, per pondus fetus inclusi, aut per nimiam resistantiam colli uteri, & relaxationem fundi vaginae, per vehementem nisum inter parturiendum, per profusionem dolorum stando, & per extraordinariam amplitudinem diametrorum pelvis, ejusmodi procidentia evenire poterit.

Aetiologia.

§. 24.

Jam pergo ad causas, quae dividi possunt in *proximam* & *remotas*, hae vero iterum in *praedisponentes* & *occasionales*.

De

- u) Ill. LEVRET dubitat uterum gravidum procidere posse, atque credit, esse tantummodo

De *causa proxima* iudicium antiquiorum medicorum omnino est longe diversum ab iudicio recentioris aevi auctorum. — Maiores autumabant eas quaerendas esse in relaxatione aut ruptura ligamentorum uteri. Opinabantur enim quod in casu relaxationis, ligamenta uteri per congestionem serosorum ac mucidorum humorum, per cumulum cruditatum, per refrigeria aliasque causas, quasi paralytica fierent, atque inde uterum in loco suo retinere non possint; quod in casu rupturae, per causam violentam, facta putredine & suppuratione id malum existeret v).

§. 25.

do prolongationem colli uteri, in quo infans cum capite sit, atque extra labia magna eminere. vid. Journal de medecine T. XXXIV. p. 457.

v) GOELICKE tract. de procid. uteri & BOEHMER de prolapsu & inversione uteri ejusque vaginae relaxatione in Ill. HALLERI disp. chir. T. III. MAURICEAU l. c. T. I.

§. 25.

Ad hanc refutandam opinionem, nil amplius requiritur, quam ut structura ligamentorum uteri anatomice contemplemur: ac tum sine negotio invenimus, ea constare duplicaturis peritonaei, quae retibus nervorum vasorumque sanguiferorum percurruntur, id quod profecto adversatur ideae, quasi facerent aliquid ad confirmationem w). Observationes quoque id evincunt medicorum, qui operam navarunt, illustrare causas hujus morbi, qui omnimode reperiunt ligamenta
uteri

p. 390. PUZOS l. c. p. 241. SMELLIE treatise on the theory and practice of Midwifery, p. 422. AITKEN principles of Midwif. Edinb. 1785. p. 112. aliique.

w) III. HALLER prim. lin. Physiol. Cap. XXIX. §. 842. ait: Peritoneum utero accurate nectitur absque adipe medio, ut ipsi undique pro externa membrana sit. Non intercidit, quin totus uterus mobilis sit.

uteri fuisse etiam in naturali situ relaxata x). Dolores in ligamentis oriuntur plerumque, si prolapsus instat, non vero ante ejus impetum, augentur cum ejus incremento, & sunt sequelae tensionis, quam partes patiantur. Si vero uterus suffulcitur, atque ea re tensio tollitur: dolores transeunt, atque inde tuto concluditur falsitas opinionis priscae veterum.

§. 26.

Probabilior atque experientiae magis congrua sententia plurimorum auctorum nostri aevi, qua docemur, contemplandum fundum vaginae esse, ut solum uteri fulcimentum. Quid enim esset, quod retineret uterum in ea positione, nisi eadem haec pars: cum vel
nec

x) SAVIARD l. c. Obs. XI. p. 42. Ill. CAMPER l. c. p. 107. ASTRUC l. c. T. III. l. II. Cap. 10. p. 396. LEVRET l. c. T. XL. p. 169. sqq.

nec a latere anteriori nec posteriori cum fir-
 mioribus partibus sit in nexu, quam cum sic
 dicta vagina? nisi natura adeo etiam hanc
 iterum per ligamenta sacro-ischiadica, atque
 per musculum constrictorem cunni muniisset,
 atque in suis limitibus teneret: feminae
 etiam vel non adeo vehemente corporis mo-
 tione, vel in quovis partu prolapsum uteri
 deberent metuere. — In procidentia ergo
 oriunda necesse est, ut fulcrum, quo uterus
 in superius cogitur, non amplius gravitati
 corporis subjacentis resistere possit, hoc est:
 ut vagina in parte superiori, ubi connecti-
 tur cum segmento inferiori uteri, relaxetur,
 extendatur, corpusque uteri recipiat. Si
 ligamenta sacro-ischiadica & constrictor va-
 ginae sufficiunt, gravitati uteri delabentis
 resistere: tunc modo prolapsus est primi
 gradus, hoc est incompletus. Si vero
 partes jam memoratae coguntur cedere, vel
 per violentum effectum, vel per longum
 tem-

temporis intervallum, vel 'per continuatam causam relaxantem: tum demum existit prolapsus uteri completus, sicuti a me sub decursu hujus morbi delineatus est.

§. 27.

Determinata proxima hujus mali causa, progrediendum est mihi ad enumerationem *causarum remotarum*. Ordior ergo a *causis praedisponentibus*. Sub hoc nomine eae intelliguntur, quae vel quovis modo relaxationem fundi vaginae excitare possunt, sic tamen, ut nondum prolapsus inde eveniat. Sunt modo, ut pathologi ajunt, *feminia morborum*, quae sine accessu potentiarum morbum proprium efficere nequeunt. Quae tamen partes in euni statum atque situm conjiciunt, ut vel levissimis causis ex pristino situ moveantur.

§. 28.

Quemadmodum vero laxitas pulmonum, viscerum abdominalium, & vitia aliarum
 C 3 partium

partium C. H. a parentibus in liberos quasi haereditaria mala traducuntur: sic opinor, talis dispositio ad hunc morbum in matre ad filiam transire potest. Haud secus eadem dispositio potest apud infantes in utero matris eorum, sicut quaevis alia monstrosa forma, progenerari, sine ullo respectu antea habito ad idem matris malum. Haec consistat licet in vero innato prolapsu, vel modo in inclinatione genitalium ad hoc malum: excitentur vel hoc vel alio vitio humorum matris, vel aliis vitiis aciei physiologorum & pathologorum anſam speculandi praebentibus: hae observationes quorundam doctorum huc spectantes nobis usui esse possunt, e. g. VAN DER WIEL y) qui prolapsum vaginae offendebat, in puella recens nata,

y) Obs. rariorum centur. posterior p. 369.

Haec observatio proprie non ad rem facit, tamen satis esse posse, credo, ad thema meum confirmandum.

nata, quae insuper in lucem prodibat fractis
vertebris lumborum. Quod exemplum fal-
tum docet, quod prolapsus ejusmodi partium
etsi non plane innascatur, attamen disposi-
tio certe per nativitatem oriatur. Pathologi
id sub titulo vitii connati exprimunt.

§. 29.

Quod genitales partes in articulo partus
variis modis male afficiantur, id clarum est
ex numero malorum infinito, inde prove-
nientium, quae malorum seges adscribi pot-
est, vel imprudentiae, vel ignorantiae ob-
stetricum, vel male applicatis instrumentis
& manibus, in sinistro infantis situ, vel prae-
ternaturali magnitudini alicujus partis infan-
tis, e. g. si partus prodit natibus praeviis, si
commoratio nimis magni capitis diutius,
quam par est, in vagina durat cet. — Huc
accedit adhuc si mulier est constitutione cor-
poris laxiori & humidiori; si tonus fibra-

rum debilitatus est, morbo praecedenti, longo usu medicamentorum resolventium (& quidem mercurialium) calidis potionibus, habitatione in humidis nebulosis regionibus; nec non duris continuisque laboribus corporis, quod per antecedentes partus labefactum est; nimia pinguedine corporis, quam subito sequitur macies; porro si genitalia suppositis carbonibus ardentibus foveantur; si mulier saepiuscule nudis pedibus per aquas frigidas meat (ut majores credebant); si fluore albo laborat, aut si menstrua nimis sunt profusa; aut adeo saepe haemorrhagiis habitualibus est afflicta, vel alvum habet duriorem: tum certe ex omnibus his rebus dispositio ad hunc morbum conjicitur, immo adeo ipse prolapsus generari potest.

§. 30.

Causae occasionales si accedunt, hoc est, si certae causae vim habent & exercent in
uterum,

uterum, ut ex suo loco deprimatur: tum exserit se morbus, quem novimus sub denominatione prolapsus uteri, quae causae, ut dixi jam, diversae possunt dari. — Numerus causarum sane non parvus est: sed omnes eo reduci possunt, quod ex ratione supra adlata, pressione actum exerceant. Eo referuntur ea, quae sequuntur: duri gravesque labores, praecipue ubi corpus incurvandum est; ut fieri solet ruri more consueti in ruralibus operis; saltus de alto quodam loco cruribus distractis, retentaque respiratione; tussis vehemens diuque durans, in specie tussis convulsiva; sternutatio 2) acriter concutiens; vociferatio & cantatio, utpote quae causa in monialibus locum obtinere potest; contentio in detrahendo gravi onere ex alto loco, aut quod

C 5

mulier-

2) Mirandum sane est, quod majores ad prolapsum reducendum errhina dederint, quia augurabantur uterum cum respiratione reduci.

muliercularum more consuetum negotium est, expansio & adfixio lintheorum ad fenestras; asthma convulsivum & suffocativum, insultus epilepticus, dysenteria ex infirmitate & conatibus iteratis ad exonerandam alvum, vomitus enormis & imprimis cholera; cadens onus quoddam in abdomen, aut currus incurfio super corpus, saltus supra fossam, animi pathemata, polypus orificii uteri, terror, subitanea relatio rei ingratae, magna coeundi libido (ex majorum sententia, utpote opinantium, utrum tunc descendere.) a)

§. 31.

Usitatissime dat partus causam occasionalem, etsi LA MOTTE b) non vult hoc fa-

a) ARISTOTELES de hist. anim. L. 7. C. 2. ait: multis furore veneris percitis, vel juvenilis aetatis ratione, vel longa consuetudine descendit uterus, qui, ubi satiatus fuerit, sese deinceps in suum locum recipit.

b) Traité des accouchemens T. II, p. 1252.

fateri, praecipue si mulieres coguntur dolores ad partum maturius perdere, quam necesse est, aut jacentur toto tempore stare, vel quoque in hoc positu partum edere. c) — Itidem prolabi uterus potest: citiori attractione funiculi umbilicalis ad protrahendas secundinas, antequam solutae sunt, & priusquam natura ipsa conatur eas ex utero amolari. Porro hoc malum ingruit, si mulieres confestim partu edito, ad sua negotia redire solent. — Plurimae harum causarum ita agunt, ut per tensionem muscutorum abdominalium, & diaphragmatis, cavum abdominis coarctatur & contenta ejus pelvim velius urgeantur.

Prognosis.

§. 32.

In genere adferri potest, in quovis prolapsu prognosin esse dubiam. Interim tamen

c) Ill. HALLER praelect. ad H. Boerhaav. instit. medicinae p. 58.

men ea propius determinanda secundum ejus gradum. Cardo rei versatur vero in eo, utrum uterus plus vel minus descenderit, utrum inflammatus, exulceratus, gangraenofus sit. Pro secundo ipsae aegrotantes, aetas earum, atque corporis constitutio expendenda est. Ad haec omnia spectandum: utrum cura radicalis, an palliativa, an nulla sit adhibenda. — In prolapsu incompleto recenti, in corpore sanissimo juvenili, ac florente, sine remota longiore praedispositione orto, prognosis semper est felix ac spes praebetur, felicissimae sanationis. — Si vero contraria omnia contingunt, si prolapsus est completus; tum viscera abdominalia, ut in herniis fieri solet, locum eum implerunt, ubi antea uterus erat, atque adeo per quasdam occasiones accidentes accreverunt: tum demum prognosis dubia est, ad felicem reparationem sanitatis curandam. — Huc accidit, si uterus per longam anno-

rum

rum intercapedinem prominuit, de quo casu MAURICEAU d) & SAVIARD e) exempla in medium protulerunt; sique scirrhusus est redditus, & ratione voluminis multum increvit, si per defluxum urinae inflammatur, vel adeo exulceratur, atque in carcinoma abiit: tum quoque prognosis admodum dubia est, ac morbus incurabilis. — Uterus prolapsus si gangraenosus est (quod rarius in hoc accidit, quam tum, si uterus invertitur), tum sane est periculum in mora, & mulier versatur in articulo mortis. — Ex consueta & vulgari sententia creditur, quod uteri prolapsus impediat conceptionem & graviditatem. Id vero suam admittere exceptionem, hoc per experientiam probavit JALOUSSET *) in femina, quae tum, cum concubuit cum marito, uterum
 redu-

d) l. c. T. II. p. 79. seq.

e) l. c. p. 79. aliisque locis.

*) l. c. p. 366.

reducebat, qui tamen postea iterum exhibat, quae nihilo fecius gravida facta utero foris eminente, parturiebat.

Curatio.

§. 33.

In curando hoc malo, quod maxime inolestum est, atque conspicuum in feminis inferioris sortis, partim urbanis partim rusticis, tres indicationes sunt peragendaе:

1. Cavendus prolapsus, si nondum plane ortus est,
2. reducendus post ortum ad suum pristinum locum,
3. retinendus est sua sede,

§. 34.

Ad *primam indicationem*, cavendum est, & id curandum, ut tam causae praedisponentes, quam occasionales impedian-
 In
 actu

actu partus ideo caute prospiciendum, nec
 puerperis concedendum est, ut maturius ju-
 sto ad operas subeundas revertantur. Si
 metuendus foret prolapsus in femina, quae
 plures justo frequentiores edidit partus: ei
 concedatur otium, duri intensique labores
 impediantur, praescribatur diaeta roborans,
 jubeatur comprimere genitalia, post cessa-
 tionem fluxus lochialis linteolis vino cali-
 do madefactis, aut per metrenchytam in-
 spargatur altius, ut fibrae vaginae iterum
 vim contractibilem & cum ea simul robur
 obtineant. Si in magna sternutatione, tuss-
 si, vomitu, in corpore scilicet praedisposi-
 to, prolapsus esset timendus, removeatur
 subito, ex ratione causarum, quae convenit.
 Succurrendum est obstructioni alvi diaeta
 fluidiori, moderetur medicus dysenteriam
 aliosque fontes plures, ex quibus occasio
 quovis modo ad prolapsum fluere potest. Ro-
 boretur corpus debilitatum, usu chinae, li-
 maturae

maturae chalybis aliisque remediis ad proximam causam operantibus.

§. 35.

- Si *descensus uteri* jam adest, quem ASTRUC (l. c.) primum gradum vocat, si segmentum inferius in exploratione interna tangendo sentitur propius: tum res omnis in eo agitur, secundum causam proximam, quod ea omnino poscit, fundum relaxatum vaginae arctiorem reddere, atque contrahere, ut praeveniatur procidentiae, ne usus pessarii sit necessarius. — Antea vero quam ad usum remediorum externorum progredior, quaedam praemonebo *de diaeta vitaeque regimine*.

§. 36.

HIPPOCRATES^{f)} dudum suavitatem parcam, eamque cum accommodato vitae regimine

f) De morb. mul. L. II. C. 38. (28.) ait: cibis vero paucissimis utatur neque acribus neque falsis.

regimine combinatam, quod fere primarium est requisitum, ad hoc malum fugandum. — Prae aliis inservit victus tenuis & siccus, huc pertinet usus jusculorum succi plenorum, carnis assatae, tenerrimarumque herbarum. Porro commendanda sunt varii fructus arborum, vel recentes, vel macerati; parcior usus vini adstringentis, & in genere ejusmodi nutrimenta, quae minus feculenti continent, atque aegrotanti non cient alvum duriores, sed liberiores promovere. Legumina cujusvis generis minus apta sunt, quia nutrimentum crudius est, ac feces nimias relinquunt. Jaceant semper in situ horizontali, magis duro quam molli lecto, levique tegumento contegantur. Id quoque curetur, ut aer habitaculi alternis vicibus renovetur. In exoneratione alvi maneant pariter in situatione horizontali g).

§. 37.

g) HIPPOCRATES porro ait (24) Ubi vero ventrem exonerare voluerit, decumbens id faciat, & sic etiam LA MOTTE l. c. p. 1284.

D

§. 37.

Ut *remedia topica*, possunt adhiberi praecipue adstringentia tonica, de quibus materia medica infinitum exhibet numerum. Usurpentur partim in forma decocti ad injectionem, partim ut fumigationes, fots aliisque modis. — Pro *adstringentibus decoctis* adhibentur radices bistortae, tormentillae, cortices e quercu & granatorum, gallarum turcicarum, flor. rosar. rubr. cet. Ex his speciebus eligantur praestantiores, infundantur vel vino rubro vel aqua fabrorum per aliquot dies, adfundantur adstringentia fluida ac solutione facilia, e. g. solut. aluminis, vel aqua vegeto-mineralis Goulardi vel oleum martis dilutum. Hoc applicetur ope instrumenti, cui nomen Metrenchyta, (Mutter-spritze) h) vel subsidio spongiae formatae ad figuram vaginae fundo ejus inferatur.

§. 38.

h) Mentionem hujus Mentrenchytae multi auctores jam fecere, atque varias ejus figuras

§. 38.

Nec contemnendae sunt *fumigationes*
siccae aut *humidae*. In priori casu infer-
 viunt

guras videre licet in BRAMBILLA Armament. Chirurg. Tab. XXX & XXXI. ut & apud AITKEN l. c. T. 5k. Quae delineata est Tab. I. Fig. 3. structa est ex laevi rotundo eburneo cylindro supernè sensim fastigiato; ut eò melius inferatur. In fine ejus adligata est lagenula ex resina elastica cum ejus collo; quae ô pollicum ambitum complecti debet: ut mulier eam commodè manu tenere queat. In cylindro supernè sunt quinque apertiones; per quas, si aer ex lagenâ premitur, materia injectionis sucta; & opè compressionis in lagenam egeritur. Id commodi habet hoc instrumentum, ut feminae ipsae id sibi applicare possint. (Hanc Metrenchytam ad exemplum Ill. praëceptoris FISCHERI exprimendum curavi.) Ejusmodi breviter etiam meminerunt Ill. SCHWEDIAUER in Practical Observation. on

viunt resinae fragrantēs : thuris, mastichis, olibani, seu pulveris fumalis officinalis, de quibus carbonibus injectis, fumus ope infundibuli excipitur, perque cavatum sedile ad vaginam ducitur. — Pro humidis fumigationibus adhibenda sunt decocta ex herbis aromat. & florib. effectum optatum exhibentia, ut e. gr. herbae serpilli, thymi, rosmarini, cocti cum vino rubro, id quod prae ceteris Puzos i) laudibus effert. Caveatur, ne haec remedia nimis calida adplicentur. Nec non generatim externa remedia sunt admovenda, quam diu menses & lochia fluunt.

§. 39.

Non adeo multum est tribuendum, internis medicamentis, neque multum auxilium

ex

venereal complaints. Lond. 1784. 8. & Cl. WHITE Untersuchung der Geschwulst bei Kindbetterinnen an den untern Gliedmaßen. Wien 1785. 8. p. 59.

i) l. c. p. 285.

ex iis sperandum. — Haec enim remedia omnino tum aliquod ferunt auxilium, si prolapsus nondum plane se exseruit: si enim jamjam delabitur in vaginam, vel adeo extra partes genitales conspicitur: nulla spes levamenti ab iis capienda, sed transeundum est ad usum pessariorum.

§. 40.

Quod ad *reductionem uteri* pertinet, ea facile peragi potest: si prolapsus adhuc recens ortus est, sique prodeuntes partes nondum valde intumuerunt. — Multa tamen obstacula plerumque se offerunt reductioni, quae penitus nosse oportet.

Primum impedimentum est *angustia vaginae*, si in virginibus accidit, quod Ill. CAMPER k) adlegat. Ex hac ratione cum fructu adplicantur: vapores calidi ex decoctis emollientibus, inunctiones ex oleo amygdalarum, unguento dialtheae, butyro re-

D 3

cens

k) l. c.

cens facto, aliisque ad relaxationem hujus partis cum comodo.

Alterum impedimentum faciunt *acervata* *urina* in vesica urinaria, atque *accumulatio fecum* in intestino recto, quae aditum, quam difficillimum reddere solent. Bene ergo agitur ex consilio Ill. LEVRETI 1): aegrotanti antea emollientem clysterem adplicando, & urinam derivando, si sponte fluere recusat.

§. 41.

Si partes prolapsae per continuam urinationem, aut per fricationes a vestitu factas, vel excoriatae, aut adeo in quibusdam partibus exulceratae sunt: tum quidam suadent, antea sanare ulcuscula, & postea partes reducere. At vero Ill. SAVIARDII m) obser-

1) l. c. T. XL. p. 177. 8.

m) l. c. p. 46. & Ill. ac venerandus praeceptor RICHTER in Chirūrg. Bibl. 7. B. 4. St. p. 655. ait: Man kann kein Beden-

observatio, & casus quem ipsemet vidi, & cui interfui, me aliud edocuit. Adlata enim erat villica ex pago vicino Rosdorf in nostrum Instit. Clinic. Reg., cujus uterus per spatium mensis prolapsus erat, ubi vagina valde excoriata & partim ulcusculis obfessa erat. Attamen partes feliciter absque consequente molestia reducebantur. Id certe probat: optime consultum esse, causam excoriationis & exulcerationis; hoc est, proidentiam tollere. — Si autem partes *summo gradu inflammatae* fuerint, atque *intumuerint,*

ken haben, einen solchen Muttervorfall zurückzubringen, denn die Geschwüre sind nicht auf'm Körper der Gebärmutter sondern an der innern Oberfläche der Scheide die ihn bedekt; und gewis heilen sie ausserhalb dem Körper, wo sie manchen Reizen ausgesetzt sind, nicht so leicht als wenn die Mutterscheide zurück gebracht wird.

tumuerint, sic ut nunc temporis nulla fieri possit reductio: tum demum adhibenda est methodus antiphlogistica, i. e. venaesectio admittatur, cataplasmata emoll. imponantur, & situs corporis horizontalis commendetur, donec minuatur volumen partium.

§. 42.

Tum cum *procidentia est inveterata*, obstacula sunt majora, partim propter tumefactum uterum, partim ob mutationem situs viscerum abdominalium, quae jam in locum uteri procidentis introiverunt n). Si ergo uterus est reducendus, loco pristino diu exemptus, tunc conjunguntur cum reductione dolores colici, ob pressionem partium vicinarum, obstructio alvi, adeo etiam animi deliquia, aliaque symptomata, quae cogunt chirurgum,

n) Ill. BRUNS Sendschreiben an den Hofr. Henkel in Ill. RICHTER Chir. Bibl. 3 B. p. 140.

gum, uterum iterum demittere. Si nullo modo fieri potest, ut volumen vel per remedia emollientia, vel per reprimentia minuat: nihil reliqui est, quam ut partes prolapsae, per suspensorium o) factum ex panno cerato, contra adfectionem aëris externi, urinae, fecumque tuto muniantur, eoque spectetur, ut quantum potest ulcera, scirrhus & gangraena arceantur. — Ill. SAVIARD p) suadet, in auxilium vocare aliquem, in suscipienda reductione majoris voluminis, qui, dum nititur partes intro referre, interea partes sustentet.

§. 43.

Si prolapsus cum carcinomata & gangraena conjunctus est: tunc mors est inevitabilis; nisi operatione praeventum fuerit. Ex-

D 5

terna

o) ASTRUC l. c. p. 422, Ill. STEIDELE l. c. p. 171.

p) l. c. p. 76.

terna remedia in hoc malo parum juvant, ac meo quidem iudicio, is ludere videtur, qui, ad tolerandam adfectam malo partem, eamque insuper inutilem suaderet: cum remedium securum optimumque, operationem scilicet, habeamus. q) Omnino quidem ejusmodi operatio, ut & aliae, e. g. bronchotomia, variis hominibus est inaudita, atque damnuanda videtur; sed feminae versanti jam in periculo mortis est beneficium. Hanc vero operationem & resectionem sine vitae impendio fieri posse; id testantur exempla majorum, & nonnulli observatores nostri aevi r), quod

q) OVID. *Metamorph.* L. I. v. 190. canit: immedicabile vulnus, ense recidendum, ne pars sincera trahatur.

r) PARAEUS opp. chirurg. L. XXIII. C. 41. AETIUS libri medicinales L. XVI. Cap. 76. PAULLUS de re medica L. III. C. 72. ROUSSETUS de partu caesareo in opp. Gasp. Wolf T. II. Hist. VI. p. 536. F. PLATER obs.

quod ex errore commisso, vel ex indicationibus, uterus absque magnis sequelis effectus fuerit. — Operationem ipsam describit ASTRUC, s) qui consilium dat: ligaturam esse adplicandam supra scirrhosam & gangraenosam partem, in saniori ac sincera parte, cavendum vero, ne meatus urinarius ipse subligatur t). Exinde melius esse, si injectiones fierent, quo facilius distinguatur a partibus ceteris. Postea debere uterum ampu-

obs. med. L. III. p. 718. habet elegantem historiam, de muliere cui corruptus uterus ablatus fuit, menstruis postea per podicem constanter sese expurgantibus. In recent. script. leguntur exempla in Ill. WRISBERGII, praeceptoris maxime colendi, comment. de uteri mox post partum naturalem resectione peracta non lethali, & FIGUET Journal de medecine T. XLI. p. 40. seq. cet.

s) l. c. p. 423.

t) RUYSCH l. c. T. I. Obs. VII. p. 10.

amputari, subter ligatura, cultro incurvato, sicut in amputatione in usu esse solet. Vulnus esse deinde bene curandum, ac partes forsan adhuc prominentes esse reducendas.

§. 44.

Requisitum vero praecipuum est ad ultimum, in reducendo utero, *situs aegrotantis*. — In ea re, ea quae sequuntur sunt observanda: ex consilio Cl. LEVRETI u) adhibeatur in curatione, quantum potest matutinum tempus: quia situ nocturno horizontali, uterus si non totus, tamen ex parte introivit: praeterea reponatur corpus feminae vel transverso situ in lecto, vel in sella ad partum (Geburts-Stuhl) quam Ill. STEIN invenit, ut podex altior sit, crura sint incurvata & extensa, superior pars corporis vero inferius declinetur, utpote quo situ cavum abdominis amplificatur, reductio uteri vero multum juvatur. Durante vero reductione

u) Journal de medecine T. XXXIV. p. 447.

tionem aegra se teneat sedatam atque tranquillam. — Remotis, ut credo, omnibus impedimentis, quae reductioni prolapsus obstant, progredior nunc ad ipsam reductionem.

§. 45.

Chirurgus digitos suos cum oleo olivarum vel amygdalarum, vel recens facto butyro, vel alia substantia ex oleo, nec minus partes procidentibus illinat: adhibeat digitum indicem & medium dextrae manus, dum eos ambo, uti fit in exploratione interna, erigit & extendit, atque ita in regione orificii uteri, ergo in segmento inferiori adplicat, ad reductionem partium prolapsarum. Cum manu sinistra vero interea constrictorem cunni caute oleo tingat, atque simul parumper extendat. Reductio vero itidem caute fiat, & axi pelvis congruenter est instituenda; usque dum ad locum suum rediit, atque ulteriori reductioni

ductioni obnititur. v) Si durante reductione vel post eam varii insultus oriuntur, quos supra induxi: tum fiat venaesectio, adhibeantur cataplasmata emollientia ad abdomen; ac detur leniter purgans ex rhabarbaro.

§. 46.

In *prolapsu uteri gravidi* observatores sequens praebuerunt consilium: Ill. GIRAUD w) inducebat uterum cum infante prolabentem; quia dolores ad partum non expulsi-

vi

v) Veteres utebantur quibusdam adminiculis ridiculis, ad promovendam reductionem uteri. Adplicabant cucurbitulas cum multa flamma ad mammas; circa umbilicum, dabant sternutamenta; vomitoria. ARISTOTELES laudat adeo coitum, si summo desiderio uterus procidat. HIPPOCRATES de nat. muliebr. C. 39. commendat graveolentia in pudenda, quia opinabatur, uterum redire per graveolentia gummata.

w) Journal de med. T. 45. p. 232.

vi erant. Femina rei domesticae praecerat per decem dies, his elapsis feliciter edebat partum, nullo prolapsu postea insequente. Cl. JALOUSSET x) cogeatur incisionem facere, quoniam orificium uteri erat callosum, ac femina jamjam per triduum doloribus ad partum erat adfecta; inde rumpebatur orificium magis magisque, atque infans in lucem prodibat. Ill. SAVIARD y) videbat quoque prolapsum uteri gravidi, & femina cum doloribus ad partum sufficientibus, infantem enitebatur. FABRICIUS z) eundem casum expertus est, & quidem in femina triginta annos nata, cujus uterus inde ab duobus mensibus ante dolores partus prociderat. Eam transverso situ in lecto jacere jussit, clunibus elevatis cum pectore, quo muscoli abdominales relaxentur. Inde orificium uteri se aperiebat, atque mulier absque ulla instrumenti adplicatione partu gaudebat felicissimo.

§. 47:

x) l. c.

y) l. c.

z) l. c.

§. 47.

Ad *retinendum vero uterum*, ea quae sequuntur sunt observanda: corpus inserendum est, quod propter figuram & structuram potest segmentum inferius suffulcire, & prolapsum cavere. Hoc corpus vocatur *Pessarium*. Quorum cum magnus adsit numerus, nec omnia sint eodem usu, sed electio valde necessaria: infra operam navabo, species diversas proferre, atque modum adplicationis describere. — Pessario ingesto genitalia externa secundum consilium Ill. LEVRETI a) linteo convoluto sunt obtegenda, cujus posterior & anterior extremitas in cingulo circulari adsuta est, quo feminae abdomen cingitur. Si persona est firmiore corpore: tunc id non opus est, sed femina modo per aliquantulum temporis crura committat, ut pessarium possit

certum

a) l. c. T. XXXIV. p. 446.

certum capere situm. Jubeatur in primis temporibus abstinere ab omni motu vehemente, ab adscensu graduum aliisque: commendetur ei diacta, quae supra laudata est: saepiuscule injiciatur, ad fundum vaginae firmandum, unum ex supra nominatis decoctis adstringentibus, vel vinum calidum, ut LEVRET voluit. Femina exoneret alvum vel situ horizontali, vel ita, ut pressione in genitalia, quasi prolapsum impediat. Dissuadeatur ei, nimia applicatio clysmatum emollientium, nam HIPPOCRATES ait: restituto autem utero, non sunt clysteres injiciendi, ne pars magis relaxetur & humectetur. Si vero adsit indicatio: tum clyster ex aceto & aqua constans, fini congruus, adhibeatur.

§. 48.

Feminam esse posse gravidam, etsi pessarium in fundo vaginae lateat, id confirmant

mant observationes ROUSSETI, b) LA MOTTE, c) SAVIARDI d) & LEVRETI e). Sit vero pessarium rotundum, habens in medio apertionem, convenientem orificio uteri. — In medio tempore graviditatis pessarium commode eximi potest: etenim partu adveniente extractio est periculosa, in specie si pessarium diu latuit.

Haec satis dicta sunt. Jam me verto ad tractationem de pessariis, in qua vero tantummodo meditabor, de eo quod utilissimum

b) de part. caes. in Opp. G. W. T. II. p. 584.

c) l. c. T. II. p. 125. in nota ait: Si la femme incommodée est d'un bon temperament & encore jeune, on lui conseillera la grossièssè qui ne la sçauroit mettre en pire état: elle peut au contraire lui être salutaire & la guérir.

d) l. c. p. 42.

e) l. c. T. XXXIV, p. 458.

lissimum est, inutilia vero silentio praeteribo.

De Pessariis.

§. 49.

Usi sunt pessariis f) antiquiores jam inde a multis seculis: sed tamen non satis tuto determinari potest, quis eorum primus fuerit inventor. Verosimile vero videtur, quod in illis praeteritis temporibus ipsae feminae necessitate coactae fuerint, prolapsum uteri vel vaginae retinere. Sed tum non aderant artificiosa pessaria, quae jam in usu sunt; sed omne, quod usui esse poterat, ab iis adplicabatur: linteola convoluta, globuli cerei, gossypium aliaque plura. Majores sua aetate multum aestimabant

E 2

ejusmo-

f) Aliis nominibus vocantur *suppositoria uterina, pessae, priapisci, balani, nasalia* cet. germanice *Mutterkränze, Mutterhalter, Mutterzäpfgen,*

ejusmodi pessaria, quorum ope medicamenta utero ingeri poterant, eo consilio; ut partim suffocationi, partim tumori succurrerent, jam ut excitarent fluxum menstruum, jam ut corrigerent nimiam uteri humiditatem, jam ut vermes ex eo expellerent, vel ut ad alios fines tenderent.

§. 50.

Jam pessaria usurpantur ob triplices fines: in prolapsu uteri, in prolapsu vaginae, & in hernia vaginae.

§. 51.

* Pessarium in prolapsu uteri sit sequentibus qualitatibus: sit leve ac commodum ad ingerendum; segmentum inferius uteri fulciat, sine dolore excitato, nec plus justo extendat; non tegat orificium uteri: inde habeat in medio aperturam ad deductionem
fordium,

fordium, quae ergo numquam nimis magna esse debet; non impediat sedes vel mictum; non facile possit arrodi: ergo non facile putrescat, aut fragile sit; sine magna molestia sit eximendum, si id volumus.

§. 52.

In prolapsu vaginae ejusque hernia, ut Vir Ill. ac Venerabilis RICHTER g) probat, pessarium habeat formam cylindri, ad implendam vaginam totam in suo ambitu. Sit cavum: ut feces effluere queant; superno loco ita structum sit, ut latas, planas habeat oras: ne orificium uteri & segmentum inferius teratur aut vulneretur. — Indicatis jam qualitatibus, quae requiruntur ad pessarium, & quidem quantum potui brevissimis verbis posuimus omnibus levioribus

E 3

cir-

g) Abhandlung von den Brüchen, 2 Theil, P. 164.

circumstantiis: lector benevolus jam de infra describendis pessariis judicium suum ferre potest: jam vertor ad specialiore eorum descriptionem.

§. 53.

Sphaerica pessaria primo per majores fuerunt adhibita, uti ex eorum scriptis h) patet. Conficiebant ea ex ligno, subere, argento, auro, glomeratis filis, cera, & excavatis nucib. juglandib. cet. & ut eo facilius extrahi possent, in inferiori loco filo muniebant. — Unum eorum, quod nuperrime iterum innotuit, est id quod SANDYS composuit, & quod per longa tempora sub oblivionis pulvere delituit. Constat ligno orbis forma, quod probe excavando tenue leveque factum est.

III.

h) SCULTETI Armament. Chirurg. ex edit. Sprög. 8. p. 32. Tab. 19. HILDANI observationes Chirurg. Cent. IV. Obs. LXI.

Ill. DENMAN i) inquit: hoc esse non tantum facile adplicatu, sed etiam commodum latu, nec tam facile, ut alia, excideret. Usus ejus postea se ostendet.

§. 54.

Pessaria rotunda circaliformia facta, memorat BAUHINUS k) & plures alii ante hunc auctorem. Post eum laudabant eam formam MAURICEAU l), PUZOS m), SMELLIE n). Nuperrime etiam Ill. STARKE o) ligneos ex buxo tornatos annulos commendavit. Amplitudo complecti debet in diametro ultra tres pollices, crassitudo vero

E 4

num-

i) Journal für Geburtshelfer I. St. 1787. p. 85.

k) Appendix ad F. Roussleti Histor. p. 497.

l) l. c. T. I. p. 390.

m) l. c. p. 241.

n) l. c. p. 425.

o) l. c. p. 175.

numquam superet quinque lineas. Postea
ter vel quater cera tingantur, donec ha-
beant aequalem crassitudinem. Fatetur quo-
que, se ope eorum multis miseris auxilium
praestitisse, opeinque tulisse felicissimam. —
Pessaria triangularia & quadrangularia jam,
me sciente, non amplius in usu sunt: quia,
nullam adferre opem videntur.

§. 55.

Jam mentionem faciam de eo Pessario,
cujus meminit Ill. LEVRET p), in numero
planorum ovi forma factorum, quod adhuc
etiam cum utilitate usurpatur. Constat su-
bere & mixtura e gypso & cera. — Suber
oportet esse album, nec arrosum vermibus,
ope limae eo usque elaboratum, ut forma
instar ovi proveniat, cujus major diameter,
circiter duo vel tres pollices, (Zoll) minor
vero

p) Journal de medecine T. XXXIV. p. 435.

vero ad septimam partem minor est, & in maxima rotunditate, octo usque decem lineas crassum est, quod versus oras vero, & maxime versus centrum tenuitate crescit. Curatur, ut per quartam partem horae sicce-
tur in fornace, immediate post extractionem cocti panis. Tum ad manus sumitur filix paullo gravior, quam suber est, alligatur ei filum, & huic postea acus duobus capitibus. Haec acus dirigitur per mediam aperturam pessarii, & transversim super eam. Tum omne id imponitur in vas planius testaceum, lapide infra jacente, quod inditur aquae bullienti. Huic vasi adfunditur quantitas cereae virgineae, & tam diu sinitur esse in eo statu, donec suber se plane sugendo expleverit. Continuo vero ac semper necesse est, quamdiu vas inest, ut aqua ebulliat. Hoc facto, vas eximitur aqua, atque simul ope forcipis pessarium; omnia tum aqua frigida refrigerant, refecetur filum cum acu, &

ficcetur postea in aëre sicco, sed non nimium calido. Tunc pessarium intingitur in mixturem compositam, ex novem partibus cereae & una parte gypsi in pulverem triti, & quidem toties, donec pessarium ubique circiter lineae crassitudine aequali cera obductum est q). (vid. Tab. I. Fig. 2.) Cum hoc pessario convenit id, quod ASTRUC r) commendavit : at modo cereae addit therebinthinam & resinam albam.

Inventum STAUDTHII s) *pessarii, ex virgis salicis albae* confecti, hic meretur mentionem. Eligit recentes virgas ex salice, scindit eas in tenues portiones, radit postea circiter usque ad crassitudinem duarum linearum, & emollit aqua viva frigida, ita
ut

q) Utimur eo in Clinico nostro & quidem ad hoc usque tempus successu optato.

r) l. c. T. III. p. 416.

s) Ill. BALDINGER neues Magazin für Aerzte 9. B. 3. St. p. 271.

ut tenacissimae fiant. Tum saepius facta impositione virgarum paratur annulus, ovi formam referens, qui pro diametro diversus esse potest. Tum peripheria circumnectitur cum paullo tenuioribus virgis, paulisper ficcatur, ac tum circumvolvitur gossypiorum filis, quo cera, cui intingitur, melius adhaereat. Ex ejus sententia habet prae aliis praerogativas sequentes: non habere tam latas oras, non tam facile frangi, nullo negotio extrahi posse, dum digitis comprimi & in longiorem formam redigi possit pessarium: salices non inturlescere humiditate, nec ciere molestias. Per varias adplicationes se de eorum usu convictum esse confirmat.

§. 56.

Postquam modum conficiendorum pessariorum jam usitatorum rotundorum descripsi: jam pergo ad eorum adplicationem. Sumitur ovale pessarium, tingitur oleo, & tenetur pollice & digito indice dextrae manus,

nus, & ingeritur versis duobus planis lateribus ad ossa ischii, in longiori diametro. Ut primum superior ejus pars in fundo vaginae est, erigitur inferior pars sua directione in altitudinem, ut pessarium jaceat in linea horizontali, ita ut major diameter versus ossa ischii, superior apertura versus orificium uteri, inferior versus orificium ani vertatur. Commodum ex ovali pessario est id, quod eo minus ferat incommodi, si vel alvus levetur, vel urina emittatur: quia minor ejus diameter angustior est, quam major. *Applicatio rotundi pessarii* priori plane est similis, tantummodo periinde est, quae sectio pessarii prius inferatur: quia nec major nec minor diameter locum habet. — In genere versatur in eo summa rei, ut jaceant horizontaliter: quia facile per levissimam declinationem excidunt. Si vero excidunt, etsi omnis cura sit adhibita, tunc sunt sane justo minora, atque majora desiderantur.

§. 57.

Ad *peffaria munita pede*, refertur primo ROONHUYSIANUM, t) quod confectum est ligno fraxineo in forma piri. In extremo inferiori sunt quaedam foramina ad constringenda ligamina.

Peffarium SURETI u) effectum est ex ebo-
re, & conflat annulo laevi, qui nititur tri-
bus obliquis pedibus, in quibus iterum est
pes (Stiel) adfixus, recta linea demiffus,
qui in fua capfa vertitur, atque giratur, in
qua infra foramina funt, ad figenda quae-
dam ligamina, ex quibus duo ab anteriori
parte fuper inguina trahuntur, duo per
posteriora fuper os facrum in altum erecta
funf, quae fe inferunt in fafciam corporis.

Sed

t) Heel-konftige Aenmerkingen. Amft. 1663.
p. 94.

u) Ill. CAMPER l. c. p. 112. C. Bauhinus
mentionem facit talis peffarii in appendice
ad F. Rouff. Hift. in op. Spachii, p. 488.

Sed tristia exempla, quod segmentum inferius uteri, per annulum inter pedes pessarii delapsum, sese compresserit; nec non frictio ac tensio ligacularum inter corporis motum, id inventum aboleverunt.

§. 58.

Pessarium, cujus Ill. CAMPER v) meminit, compositum est ex Roonhuysiano & Suretano, loco annuli & pedum obliquo-
rum, orbem concavum adhiberi jussit, habentem duo pollices rhenanos in diametro, ac quatuor foraminibus est perforatus. Orbis terminatur in pede crasso versus extremitatem $\frac{3}{8}$ pollices, postea vero transit iterum in rotundum planum ab duobus lateribus finem, duobus etiam foraminibus perforatum est, ad figenda subligacula, quae deinde in vinculo figuntur. Pes ipse habet longitudinem $3\frac{5}{8}$ pollicis.

§. 59.

v) l. c.

§. 59.

Prae aliis omnibus antecellens pessarium est id, quod Ill. JUVILLE w) inventorem habet.) Elaboratum est ex ebore, ac tribus partibus constat, quae invicem intorqueri retinaculis possunt. Superior pars A (Tab. II. Fig. 2.) ostendit formam parvi calicis, qui in oras definit crassas lineam tenuem. Magnus diameter ab a—b tenet octodecim usque ad viginti lineas, minor verò quindecim ad septemdecim (Fig. 3.) d—e. Anterior ora (Fig. 3.) d paululum est excisa ob situm obliquum segmenti inferioris uteri. Hic parvus calix se aperit in cylindri forma B, (Fig. 2.) qui circiter longitudine est $2\frac{3}{4}$ pollicis, (Zoll) atque $\frac{3}{4}$ pollicis in diametro, ceterum vero, sicut superior pars; tenuissime elaborata est. Inferiori in parte videre est retinaculum (Schraube) in f. quo ad oblongam quadratam (Fig. 4.) partem adjun-

w) Traité des bandages herniaires p. 17.

adjungitur, quae oras laeves habeat oportet, ne incommodum faciat. (Hoc pessarium secundum ejus magnitudinem ad naturam sculptura curavi exprimendum.)

§. 60.

Fascia, qua hic vir utitur ad retinendum pessarium, quod etiam in hernia vaginæ usui est, a me paullo minor est delineata, secundum authenticum exemplum, quod Vir Ill. FISCHER ipse possidet, cujus benevola mente in hunc finem id obtinui. (Tab. II. Fig. I) Constat haec ex cingulo, (Leibbinde) a. a. a. a. quod in b. globulis connectitur. In c. c. c. c. subligacula (Beinriemen) filaminibus alligata sunt, quae in quatuor foraminibus partis inferioris pessarii d. d. adfixa sunt. In parte superiori subligaculorum (Beinriemen), offenduntur particulae quadratae, ex resina elastica, quae obductae sunt pannis sericis (soullet). Ut ostende-

ostenderem, quomodo resina elastica ibi pos-
sit adfigi, in duobus löramentis e. e. pannos
omisi.

Haec fascia inter omnes commodissima
est: nam cedit flexionibus corporis, cavet-
que tractus pessarii in vagina. Nocturno
tempore teneri potest, si pessarium exime-
re placet. Unicum incommodum esset
vero, quod partim subligacula, par-
tim quadratum, frictionem exteriorum ge-
nitalium excitet, quod vero omnibus ad-
huc fasciis est reprehendendum.

§. 61.

III. STEIDELE x) praedicat, in prolapsu
uteri inveterato ebur, vel ligno elaboratam
rotam, duobus pollicibus in diametro, quae
sistitur, quatuor cuneatim concurrentibus pe-
dibus,

x) Samml. verschied. Beobacht, chir. Vorfäl-
le 3 B, p, 171. F

dibus, in quibus agilis axis est, in quo subligacula sunt adfixa.

Methodus inductionis pessariorum cum pede munitorum, constat sequenti ratione: situ debito ab aegra facto, pes oleo illiti pessarii capitur inter pollicem & digitum indicem dextrae, tenetur oblique, & superior planities oblique ab latere infertur, postea vero magis magisque torquetur, usque dum penetratum est per constrictorem vaginae, ubi tum postea plane vertitur, & ad debitum locum fertur, congruisque fasciis firmatur.

§. 62.

Jam venio ad *elastica pessaria*, ex quibus quinque modo nominabo:

Primum, quod profero, est pessarium, quod GOELICKE y) invenit. Totum est co-

ni

y) l. c. p. 551. §. 19.

ni instar formatum, cum ampla basi, & cuspidis in forma conii detruncat. Factum est ex modice crassis, ad formam descriptam complicatis filis ferreis. Hic conus interne obductus est linteo, externe vero corio molli. In basi adligatae sunt duae teniae, quibus cum in casu necessitatis extrahi potest. Comprimi potest, & iterum, pressione cessante, redit in suum locum.

§. 63.

III. AITKEN z) laudat vesicam, quae vaginae inditur, atque postea cum tubulo mobili inflatur, qui antea vesicae alligatus & adfixus est. Si aëre est impleta: tunc tubulus extrahitur, & vesica valvula occluditur. Id modo dolendum, quod ea vesica facillime exeat, ac pro secundo, brevi tempore in putredinem abeat.

F 2

Pessä-

z) l. c. Plate M. Fig. 1.

Pessarium ex chalybe excusum Ill. SAVIARDI a) huc quoque referatur. Constat cingulo (Leibgürtel) cui juncta est lamina ex chalybe, quae curvatur usque ad vaginam, in qua parvus est pulvillus, qui fulcit uterum. Laude effert hoc pessarium in prolapsu uteri, ubi quodvis aliud immanere recusabat.

| §. 64.

Pessarium, quod forsan injuste in numero elasticorum posui, est ovale, quod etiam Tab. II. fig. 5. secundum naturalem magnitudinem delineatum est, cujus quoque, ut mihi videtur, nulla in ephemeridibus litterariis mentio adhuc est facta. Conficitur Parisiis a fratribus BERNARD & constat linteo, quod imbutum est resolutione resinae elasticae. Superior planities ejus est concava,

a) l. c. p. 47.

cava, inferior convexa: ergo ejus mira levitas, & quodammodo vis elastica, quae compressionem aliquam admittit, atque non facile metuenda arrosio, atque tumefactio, maxime commendant. — Pari modo, quam ovalia illa, ingeritur.

§. 65.

Ultimum pessarium est id, quod Ill. JUVILLE b) fecit. Constat lagenula e resina elastica confecta, suadet uti ea ambitum habente mediocris ficus. In fundo lagenae e regione colli vult, ut fiat apertura trium linearum in diametro, atque in ambobus lateribus lagenae filum, ut eximi possit, annexatur: tum fieri, ut fundus a pondere superjacentis segmenti inferioris uteri deprimatur, atque lagenula formetur in figuram infundibuli. At vero experientia cum docebat de-

F 3

inde

b) l. c. p. 181. Tab. 13. Fig. 4.

inde malum effectum : nam collum uteri se in aperturam factam demiserat, atque compresserat, doloresque & alia symptomata produxerat. Meditabatur ergo de ejus correctione, quae in eo constat. Mutabat formam pristini pessarii in formam salinae, seu parvi calicis, ambasque aperturas ejus infundibulo aureo combinabat, ad impediendam compressionem, atque effluxum mensium florisque albi non retinendum. (Loco aurei infundibuli Ill. FISCHER commendat vitreum, optime quoque fini accommodatum : nam fractio ejus non facile metuenda : quia circumdatum est massa molli & elastica.)

§. 66.]

Quod vero figura, quam Ill. JUVILLE describendam curavit, mihi non iatis placet, in Tab. I. Fig. I. tale pessarium secundum

na-

naturalem magnitudinem delineandum, curavi, atque spero fore, ut ex hac pictura, modus conficiendi perspicue cernatur. Sumitur lagena ex resina elastica duobus vel tribus pollicibus, premiturque fundus versus collum lagenae introrsum, perforatur, ita ut sit apertura collo parallela, ac postquam antea fundus in ea positione adfixus est, firmiter conjungitur aureum vel vitreum infundibulum, quod amplitudinem aere expressi habere debet, & quod inferius in collo lagenae adfigitur, dum duo parva foramina facienda sunt. Fila in utroque latere annexa inserviunt ad extrahendum pessarium. — In inductione comprimitur hemisphaerium, illinitur oleo, atque pressum infertur, dum postea latus concavum superne vertitur. Id negotium ipsae feminae peragere possunt, id quod permagnam secum fert commendationem c).

F 4

Jam

c) Si prolapsus fuerit inveteratus, & femina

na

Jam reliquum esset dicere de pessariis cylindricis, quae in prolapsu & hernia vaginae adhibentur. Sed thema meum, quod modo ea describenda suscepit, quae in uteri prolapsu usui sunt, me satis excusabit.

§. 67.

Jam quaeritur: quomodo pessaria tutissime custodiantur, ab tumefactione & putrefactione cet., cui exposita sunt in fundo vaginae? — Pessaria male composita facilius

na multipara est, tum saepe hoc pessarium justo levius est, excidit: ergo Ill. JUVILLE consulit: illud munire lamellis ex chalybè, digiti lati spatium habentibus, per subligaculum inguinale, (Leistenbruchband) firmandis, atque sese curvantibus usque ad inferiorem partem vaginae. Sed nonne melius auxilium ferret, si quis in his casibus inventam fascium cum pessario adhiberet?

lius corruptioni sunt subiecta : inde melius actum foret, si plane non fumerentur, e. g. talia, quae vel nulla vel pauca cera sunt obducta, aut quae ex mero ligno sine vestitu confecta sunt. Ea vero si tamen usurpantur, tum bene agitur, si saepius eximantur, vel ut LEVRET d) consilium praebet, interdum ope metrenchytæ aqua calida mixta cum vino inspergatur.

Molestiae & damna, quae comitantur, pessario diu remorante in vagina, sunt varia, multique medici de ea re expertos casus proferunt. Inter alios MAURICEAU e), MORAND f), SAVIARD g), Ill. STEIDELE h),

F 5

Fr-

d) l. c. T. XXXIV. p. 453.

e) l. c. T. II. p. 174. Obs. 453.

f) Memoires de l'Academie royale de chirurg. T. III. p. 614.

g) l. c. p. 47 - 49.

h) l. c. p. 113.

FIGUET i). Huc referre possum casum ex nostro Instit. Reg. Clinico, ubi mulier pessario liberabatur, quod multos periculosos effectus effecerat,

§. 68.

Uxor emeriti militis, quae vocatur Droehnen, agens circiter trigessimum septimum annum aetatis, macilenta constitutione corporis, post primum puerperium prolapsu uteri adficiebatur, qui ei regestus erat per ligneum pessarium. Post decimum quartum annum, cum misella uxor non amplius pessarii memor fuisset, varii dolores ab ea sentiebantur, in vagina, inter urinandum, in tota pelvi. Interdum dolores colici, obstructions alvi, excretio urinae involuntaria, aliaque plura symptomata orta, quibus rebus coacta fuit, medicum consulere. Recipiebatur

batur MDCCLXXXVI decimo septimo Oct. in Clinico, ab Ill. Directore FISCHER explorabatur, postea quam antea de causis quaestionem habuerat. Confestim vero vationes reperiiebantur, quas pessarium tam diu retentum fecerat: quae erant canales fistulosi, inter vesicam urinariam & vaginam, & inter intestinum rectum & vaginam conspicui sub pessario, quod arcte circumdatum erat per tunicas vaginae. E vagina ergo profluebant feces, conjunctae cum ichore sanguinolento. Tandem periculum factum est, extrahendi pessarium in sella ad partum, atque hoc in tantum succedebat, ut, at non absque operoso labore, atque cum profusione sanguinis quadam, quaedam fragmenta ope digitorum eximerentur, quia fere impossibile erat, omnia plane eximere, quia quasi ad vaginam increverant. Nec fieri poterat, ut quis ex adductis rationibus, forcipe uteretur. Facta penitiori contem-

contemplatione frustulorum pessarii, inveniebatur, quod illud lignum fuerit. Externa superficies tota obducta erat crusta, quae verosimiliter generata erat, ex urina proveniente ex fistulosa apertione, ex ichore aliisque humoribus. Quaedam frusta delineanda curavi in Tab. I. Fig. 4, & mea quidem sententia hoc pessarium *Sureti* fuisse videtur. — Curam vero radicalem hic suscipiendam non poterat sperari; sed tamen eo spectatum est, quantum poterat, ut symptomata redderentur tolerabiliora. In subsidium vocabantur injectiones emollientes ad vaginam, cataplasmata emollientia ad regionem pubis; iuterne vero emulsio arabica camphorata, ad dolores minuendos, & inflammationem partium moderandam. — Tempore aliquo post, molestiae minuebantur, & quia nulla cura radicalis possibilis videbatur, dimittebatur. Quomodo se jam habeat, ignoro, quia ex hac urbe demigravit.

§. 69.


Huic allato casui, alii non absimiles sunt, quos observatores supra nominati experti sunt. MORAND mulieri eximebat pessarium argenteum plane corrosum, quod excitat multos dolores & exulcerationes in vagina. Ill. SAVIARD cum forcipe extrahebat buxo factum conum, qui intolerabilia pathemata, excoriationes & exulcerationes effecerat. In alia muliere extrahebat globulum cereum libra gravem. In alia pessarium ex subere, quod cera non fuerat munitum, & magnas molestias, exulcerationes in fundo vaginae, febres, aliaque symptomata commoverat. Adhibebat ad ulcera curanda injectiones deterfivas. Ill. FIGUET protraxit forcipe Levretiana pessarium, quod per inagnitudinem exulcerationes fecerat. Ill. STEIDELE protraxit semiputrefactum pessarium ex vagina anus octuagenariae, cum antea ob rigiditatem partium injectiones emollientes, cataplasma-

plasmata emoll. ad abdomen adplicari jussillet.

§. 70.

Hi in medium prolati casus sufficient, ut credo, ad id praestandum, quod praestandum susceperam, h. e. iudicare damna quae pessarium diu retentum adferre potest. Ergo semper regula stat, quae jubet: saepiuscule eximere feminis pessarium in positione horizontali, atque purgare, aut si arrosum vel alio modo corruptum sit, abjicere, aliudque in locum substituere: ubi tum finis quaesitus non facile fallit, scilicet uterum retinendi in suo loco, si videlicet, a fundo relaxato vaginae sustineri nequit. — Ex reliquo pessarium nullum curat prolapsum uteri radicaliter, sed ejusmodi feminae coguntur id ferre continuo in vagina, nisi iteratum prolapsum, metuere velint.

T A N T U M.



Tab. I.

Fig. 3.

c

d

A

b

e

B

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 1.

a

b

Fig. 4.

Fig. 4.

Gruppi del it fi

EXPLICATIO TABVLARVM.

TAB. I.

Fig. 1. Juvillianum Pessarium, constans lagenula e resina elastica facta.

a Infundibulum aureum.

b Ligaculum ad extrahendum.

Fig. 2 Levretianum Pessarium.

Fig. 3 Metrenchyta.

A Eburnus cylindrus.

b canalis ejus.

c parva cavitas qua canalis finitur,

d quae tecta est operculo cum quinque

orificiis, quibus fluida suguntur & emittuntur.

E Lagenae ex resina elastica, quae cum filo

e. alligata est cylindro, qui in eo loco

excisus est.

Fig. 4 Quaedam fragmenta pessarii, diu re-
te in vagina.

TAB. II.

Fig. 1. Juvillii fascia (Bandage) minor facta ad pessarii eburnei firmam alligationem.

a. a. a. a. Cingulum (Leibbinde).

b. locus ubi connectitur.

c. c. c. c. Subligacula (Beinriemer) in eo loco, ubi ad cingulum ligantur.

d. d. Loci ubi in posteriorem partem C. pessarii adnectuntur.

e. e. particulae resinae elasticae.

Fig. 2. Pessarium eburneum ad hanc fasciam.

A. superior pars in majori diametro a. b.

B. Cylindrus cum retinaculo f.

Fig. 3. Pars superior ejusdem pessii in directione minoris diametri d. cum excisione praecipue notanda d.

Fig. 4. Posterior pars pessarii, ubi in matre cochleae, a. altera pars pessarii torqueri potest.

Fig. 5. Pessarium fratrum BERRD cum superficie concava.

Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 5.




Fig. 4.





Fig. 1.





THESES.

1. *Causa proxima prolapsus uteri semper in debilitate fundi vaginae, non vero in ligamentorum relaxatione quaerenda est.*
 2. *Balnea frigida, in paroxysmo podagrico ad pedem aegrotantem applicata, non imitari debemus.*
 3. *Clysmata frigida in morbo in minimis haemorrhoidum saepissime cum fructu adhibita esse, testatur experientia.*
 4. *Corticem mezerei, externe rheumatismis applicatum, efficaciorum esse, quam vesicatoria, plane nego.*
 5. *Uterum gravidum prolabi posse, credo.*
 6. *Vulnerum sanatio per reunionem, illi per suppurationem, non postponenda.*
 7. *Exstirpatio scirrhi & cancri, medicamentorum internorum usui, semper praeferr. potest.*
-

The following is a list of the names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*

The names of the persons who have been named in the course of the proceedings in the case of the *People v. [illegible]*